

ZASADY OPIEKI
NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV

ZALECENIA PTN AIDS 2014

| <i>strona</i> | <i>wers</i> | <i>jest</i> | <i>powinno być</i> |
|---------------|-------------|--|--|
| 51 | 7d | neurotoksycznością | nefrotoksycznością |
| 170 | 15g | sulfadiazyna p.o. 100 mg (< 60 kg) do 150 mg (> 60 kg) co 6 godz. | 500 mg co 6 godz. przy wadze < 60 kg i 1500 mg co 6 godz. > 60 kg (czyli 2,0 do 6,0 g/dobę) |
| 170 | 17g | Trymetoprym-sulfametoksazol p.o. 5 mg/kg (TMP) co 6-12 godz. | Trymetoprym/sulfametoksazol p.o. 5 mg/kg co 6-12 godz. (w przeliczeniu na TMP) |
| 279 | tab. | enfuwirtie | enfuwirtide |
| 279 | tab. | lamiwudiye | lamiwudyna |
| 279 | 5d | Recommended | Rekomendowane |
| 408 | 1g | połączone oceną | połączone z oceną |
| 409 | 9d | zmniejsza ponad trzykrotnie stężenie wiremii i trzykrotnie liczbę zakażonych komórek HIV w wydzielinie pochwowej | zmniejsza ponad trzykrotnie zarówno stężenie HIVRNA jak i liczbę komórek zakażonych HIV w wydzielinie pochwowej |
| 411 | 4g | u kobiet zakażonych | u kobiet zakażonych HIV |
| 453 | 8g | PZH z 31 stycznia 2012 r., ogółem zakażonych HIV było 15 264 osoby, w tym co najmniej 5 887 (38%) | PZH z 28 lutego 2014 r., ogółem zakażonych HIV było 17 693 osoby, w tym co najmniej 6 023 (38%) |
| 456 | 10g | zespół otępienia | otępienie |
| 459 | 1g | Choroby krwiopochodne u osób przyjmujących dożylnie środki odurzające | Choroby będące konsekwencją przyjmowania środków odurzających, szczególnie drogą dożylną: |
| 459 | 20g | <ul style="list-style-type: none"> • kłykciny kończyste u osób homo- seksualnych • infekcja HPV (rak szyjki macicy u narkomanek) | <ul style="list-style-type: none"> • kłykciny kończyste infekcja HPV (rak szyjki macicy u narkomanek) |
| 462 | 5g | <i>adherence</i> | adherencji |
| 463 | 8d | odcinka QTc | odstępu QTc |
| 465 | 4g | odcinka QTc | odstępu QTc |